

שן חלב נחבלה ו"עפה" מהפה – מה לעשות

ילדים צעירים החל מהגיל בו הם לומדים ללכת ועד לנשירת השיניים החותכות בין גיל 6 ל-7 שנים נמצאים בסיכון גבוה לפגיעות בשיני החלב. השיניים שנפגעות יותר מכל האחרות הן הקדמיות בלסת העליונה. אחת התוצאות של חבלות לשיניים היא יציאה מוחלטת של השן מתוך הפה. ההורים מתקשרים בטלפון עם תלונה ש"השן עפה מהפה". מה שההורים רואים הוא פצע מדמם במקום שבו הייתה שן (תמונה). המראה הזה יכול להתאים למצב שהשן אמנם "עפה מהפה" אבל גם למצב שבו השן נדחפה בשלמותה לתוך עצם הלסת (ראו: **שן החלב נדחפה בשלמותה לתוך הלסת**). האבחנה המדויקת תקבע על ידי תצלום נטגן שרופא השיניים לילדים יבצע במרפאתו. האבחנה המדויקת חשובה מאד כיוון שהטיפול בכל אחד מהמקרים יהיה שונה.

הבעיה

המכה שמוציאה שן חלב בשלמותה ממקומה בלסת היא מכה חזקה שעלולה לגרום נזק לשן הקבוע שאמורה להחליף את שן החלב בגיל מאוחר יותר. הנזק יכול להתבטא בפגם במראה של השן או באיבוד היכולת של השן לבקוע בעצמה למקומה בפה.

מצב נדיר אבל לא בלתי אפשרי הוא שהשן תידחף לקנה הנשימה ותגרום לחסימה בדרכי הנשימה. מצב זה יצריך הוצאת השן כפי שמוציאים גוף זר.

עלולה להתעורר בעיה אסטטית בגלל הרווח שיוצר במקום בו הייתה השן שיצאה בשלמותה.

הטיפול

אפשר לטפל בכל סוג של פגיעה בשן הקבועה המחליפה אבל רק לאחר שהשן תבקע לתוך הפה, או אחרי שהאורתודונט ימשוך אותה לפה, אם לא הצליחה לבקוע בעצמה.

חשוב מאד לחפש את השן ש"עפה מהפה". אם השן לא נמצאה, צריך לפנות בהקדם לרופא הילדים על מנת שיקשיב לריאות וישלול את האפשרות שהשן נשאפה לריאות.

ישנם הורים שמכניסים את השן לתוך כלי עם חלב וממהרים את רופא השיניים על מנת שיחזיר את השן למקומה. הטיפול הזה מקובל וחשוב מאד בשיניים קבועות שיצאו בשלמותן (ראו: **שן קבועה יצאה בשלמותה ממקומה בלסת**), אולם רק רופאי שיניים לילדים בודדים יסכימו לבצע את הטיפול.