

## סתימת שורש בשיני חלב

עששת שאינה מטופלת בזמן מתפשטת בשן ועלולה להגיע עד למוך (=עצב). כאשר נחשף המוך אפשר לשקול ביצוע קיטוע מוך (ראו קיטוע מוך). אם קיטוע המוך אינו מבוצע מתאים, והזיהום הגיע כבר אל השורשים, אפשר לשמור את השן בפה בעזרת סתימת שורש והשלמה של הכותרת.

צירוף המילים "טיפול שורש" בהקשר לשיני חלב גורם לפעמים לפליאה אצל ההורים. נכון, שיני החלב נושרות רואים רק את הכותרת. הסיבה לכך היא שהשורש, שבמשך שנים החזיק את השן יציבה בפה, נספג ונעלם כאשר השן הקבועה התקדמה לבקיעה כחלק מתהליך החלפת שיני החלב בקבועות (ראו: בקיעת שיני החלב והחלפתן בשיניים הקבועות).

כמו בשיניים קבועות, גם בשיני חלב, מסלקים את המוך גם מהכותרת וגם מהשורשים ולאחר הכנה מתאימה ממלאים את השורשים בחומר מילוי. בניגוד לשיניים קבועות, את השורשים של שיני חלב ממלאים במשחה שמסוגלת להתמוסס ולהיעלם יחד עם ספיגת השורשים.

**הסתייגות:** הזיהום משן החלב עלול לערב את השן הקבועה שנמצאת סמוך לשורשים של שן החלב. סתימת שורש בשן חלב עלולה לגרום נזק לשן הקבועה שאמורה להחליף אותה, ולכן הטיפול הנכון הוא עקירה של שן החלב.

