


שיניים עודפות

בנוסחת השיניים של האדם יש באופן תקין 20 שיני חלב ו-32 שיניים קבועות. לפעמים מתברר שנוצרו בלסת שיניים נוספות מעבר למספר הרגיל. רוב השיניים העודפות מתגלות באזור הקדמי של הלסת העליונה בסמוך לקו האמצע, בין השיניים החותכות, אבל שיניים עודפות יכולות להיווצר בכל מקום בלסתות. לפעמים השיניים בוקעות לפה וניתן לראות אותן ולפעמים הן נשארות כלואות בתוך עצם הלסת. יש שיניים עודפות שדומות בצורתן לשיניים רגילות לידן הן נוצרו, ויש שיניים בעלות צורה חריגה. רוב השיניים העודפות הן בעלות צורת יתד (תמונה)



יש סינדרומים (=תסמונות) שאחת מהתופעות בהן היא שיניים עודפות.

הבעיה

הבעיה בשיניים העודפות היא שהן עלולות לדחוף את השיניים הרגילות בגלל שבגללן יש צפיפות בלסת ולגם להפריע לבקיעה התקינה שלהן. במקרים נדירים גורמות השיניים העודפות לעצירת ההתפתחות של השיניים הרגילות.

הטיפול

הטיפול במצבים כאלה יהיה כמעט תמיד עקירה של השיניים העודפות. השאלה החשובה היא: מתי לעקור אותן? עקירה מוקדמת מדי, לפני שהשן העודפת בקעה לפה, מחייבת ניתוח כירורגי שיכול להיות קשה לילד צעיר. אמנם עקירה מוקדמת תמנע הפרעה לשיניים הרגילות, אבל העקירה עצמה אם היא לא זהירה עלולה לפגוע בהתפתחות השיניים הרגילות. מצד שני דחיית העקירה עלולה להסתיים בעיכוב בקיעה והפרעה להתפתחות השיניים הרגילות.

הגישה המקובלת היום היא לדחות את העקירה עד לאחר שהשיניים הרגילות סיימו את התפתחות השורש (בדרך כלל אחרי גיל 10 שנים) ולהתערב מוקדם יותר רק אם צופים הפרעה משמעותית לבקיעה והתפתחות של השיניים הרגילות.



